

N.º 6.
Recu le 7.
fév. 1736.

Nous souhaitons pendant cette
nouvelle année toutes sortes de
bonheur & de félicités à la très
exçellente académie de chirurgie de
Paris.

Dissertation sur les plaies faites par les armes
à feu.



Les plaies dont il s'agit sont avec chair morte,
sans contusion, si ce n'est cependant dans le cas
où les armes crevent. elles sont faites par une balle
de plomb ou de fer ou par quelque autre chose
que ce soit qui est poussé dans notre corps par
un mousquet ou par un canon. on doit
aussi rapporter à ce genre de plaies celles qui
sont faites par les armes qui en reculant ou en
sautant de leurs affûts frappent avec impétuosité,
ou la main ou quelque autre partie du
corps. De plus le coup peut être tiré à bout portant
perpendiculairement ou obliquement, le corps
étant nud ou simplement couvert de ses vêtements,
pour lors les chairs sont considérablement
altérées, surtout si le fusil est chargé avec

carton 2
d. 4

nº 60

2 de la grenaille de plomb, et s'il est bourré —
avec du papier chiffonné; car il arrive que
cette bourse poussée avec force entre dans les
chairs, et se cache quelques fois; ce qui est —
indiqué par la dureté et par quelque douleur.
à noter que si le coup est tiré en ligne directe
dans le visage de quelqu'un, et à la distance
de trois ou quatre pas sans que le fusil soit
bourré, alors les grains de poudre qui ont —
pénétré dans la peau la font paroître très
noire, il y a un grand gonflement qui —
empêche d'ouvrir les yeux, le saignement de
nez survient et le blessé tombe en défaillance.
quelques fois il arrive que le visage ou la —
main ne font que recevoir les grains de
poudre, qui n'entrant point fort avant dans
la peau, y forment par la suite des taches —
livides, lorsqu'ils viennent à se délaier.

Les plaies faites par armes à feu sont de
plusieurs espèces. Les unes sont sans déchire-
ment de parties; dans d'autres les vaisseaux et
les tendons sont déchirés; dans d'autres en fin
les os sont fracturés. des unes sont sans —
hémorragie; ce qui arrive le plus souvent.

D'autres fois le sang s'écoule avec rapidité, surtout lorsque les chairs viciées ~~et corrompues~~ se séparent. certaines plaies n'intéressent que d'extérieur le corps, dans d'autres le corps étranger a pénétré plus avant et est demeuré dans la partie.

D'autres fois il traverse entièrement le membre. tantôt le membre est conservé en entier; tantôt il y a perte de quelque partie, tantôt enfin un membre entier est emporté.



Toutes ces plaies sont beaucoup plus difficiles à guérir que celles qui sont sans chair morte. c'est pourquoi on guérit souvent de coups d'épée qui traversent le poulmon, lorsqu'au contraire une balle en traversant ce même viscère, fait une blessure mortelle. il ne faut cependant point dans ce cas perdre encore toute l'espérance; car si l'on n'a alors presque rien à attendre de l'art, on a toujours quelque chose à s'espérer de la nature; c'est ce qu'on peut voir par ^{à observation} plusieurs ^à répendues dans les auteurs; quoique néanmoins l'expérience nous apprenne qu'une plaie est d'autant plus fâcheuse, que les fonctions des parties lésées sont plus nécessaires à la vie, et que les chairs sont plus viciées. ajouterai qu'une plaie qui

4 traverser entièrement, est plus facile à guérir, que celle qui ne fait que pénétrer profondément dans un membre. surtout si la balle ou quelques corps étrangers y sont demeurés.

Quand à la cure, s'il y a émorragie, il faut arrêter le sang; s'il y a dans la partie blessée quelques corps étrangers dont la présence nuist, il en faut faire l'extraction; il faut procurer la séparation des chairs mortes, modifier la plaie, l'inciser, et la mener à cicatriser, ayant toujours égard aux symptômes.

s'il y a émorragie, il faut arrêter le sang avec de la vessie de loup ou poudre — ou de l'étoupe bien nette et bien fine couverte de bol d'arménie ou de craie blanche mise en poudre très subtile. il faut prendre des morceaux soit de vessie de loup, soit d'étoupe et les mettre l'un sur l'autre dans la plaie, surtout du côté où est le vaisseau ouvert. il faut mettre par dessus des compresses molles ou de petits coussinets, et retenir le tout par de longues bandes suffisamment serrées. si l'artère d'où part l'émorragie est à quelque une des extrémités, c'est le cas de se servir du tourniquet, qu'on doit laisser jusqu'à ce que le sang soit arrêté, ce qui n'arrive guères avant le septième jour.

oudoit pendant ce temps avoir égard à ce qu'exige
d'ailleurs l'état de la plaie.

Il faut ôter les corps étrangers qui nuisent,
comme les balles ou les grains de plomb et le
papier chiffonné qu'on a coutume de mettre
dans les armes à feu. quelquefois ces corps
étrangers sont très difficiles à tirer, et cependant
il faut avoir grand soin de les extraire. s'il y
en a qu'on ne puisse ôter, il faut comme on
dit, les abandonner à la nature, jusqu'à ce
que l'usage des remèdes suppurants, ait facilité
l'extraction de ces corps étrangers, ou jusqu'à
ce que les parties se soient accoutumées à leur
présence, de façon qu'ils y puissent demeurer
toujours, comme il arrive quelquefois aux
balles ou aux grains de plomb. lorsqu'il y a
dans la plaie une balle de plomb, après
l'avoir cherché avec la sonde, il faut
l'extraire soit avec une tenette, soit avec
un tireballe en pince, soit avec le
tireballe de Gildan qui consiste en une
barrière qu'on pousse par le trou d'une
canule dentelée renfermée elle même dans
une canule simple. lorsque la balle ne
peut être extraite de cette manière, et qu'il

6 reste peu de parties à couper pour la pouvoir
tirer par le ~~par~~ côté opposé; ce qu'on conçoit
par la dureté et la rondeur de la balle qui
s'y fait sentir, il faut inciser cet endroit et
faire ainsi l'extraction de la balle. si la
nécessité de ménager certaines parties, ne
permet pas de faire incision, il faut aban=
=donner la balle, et procurer la guérison
de la manière dont on va le dire ci après.
il peut arriver dans la suite que la balle par
son propre poids tombera peu à peu dans un
lieu plus commode pour son séjour, ou plus
favorable pour l'incision. si elle est logée
dans une partie nerveuse, elle cause des
douleurs qui peuvent exciter l'inflammation,
l'insomnie le délire. si elle est placée entre
la plèvre et les muscles intercostaux, elle
peut tomber dans la cavité de la poitrine,
et en suite causer différents maux. lorsqu'elle
est située au voisinage de quelque grosse
artère, et qu'elle la comprime, le membre
dans le quel cette artère va se rendre
s'amaigrit. il arrive très rarement qu'une
balle de plomb traverse le crâne, et ~~peut-être~~
demeure entre l'os et la dure-mère, sans —

qu'il survienne d'accidents fâcheux. il est rare
même qu'elle pénètre l'abdomen, et qu'on la
rende quelques jours après par les felles, ou qu'elle
tombe dans la vessie et vienne à y former un
calcul par une incrustation de petits graviers. -
ouvert les petits trous que les grains de plomb
font en entrant dans le corps, se ferment de façon
qu'on ne les peut tirer, on a aussi moins d'incon-
venients à craindre de leur séjour que de celui
de la balle. le papier chiffonné se tire fort bien
de la plaie avec une pincette. quant aux
corps étrangers qu'il faut extraire comme
des petites pierres, des lambeaux d'habits, des
fragments d'os; une petite pierre se tire comme
une balle de plomb, excepté qu'on ne peut pas
servir de la barrière de Gildan. les portions de
vêtements veulent estre tirées avec des pincettes
même que le papier chiffonné. à l'égard des
fragments d'os qu'on a reconnu avec la sonde
estre ~~immobiles~~ immobiles, il faut essayer s'ils peuvent estre
tirés sans douleur avec une pincette. s'ils
tiennent encore au corps de l'os par le périoste,
il faut les laisser et les remettre dans leur place
autant qu'il est possible. que si par la suite
ils ne se réunissent point l'un avec l'autre, il
faut de nouveau tenter de les arracher. lorsque
l'entrée de la plaie est trop étroite, il faut



commencer par la dilater soit avec le bistouri
 soit avec de l'éponge préparée. si quelqu'au-
 tre chose que ce puisse être empêche
 d'arracher les fragments d'os, il faut les laisser
 sortir d'eux mêmes, continuant l'application
 des médicaments capables d'exiter la supura-
 =tion.

Quand on a ôté les corps étrangers, il faut
 séparer la chair morte d'avec les parties
 saines, et mondifier la plaie. on peut fort
 bien obtenir l'un et l'autre effet par l'usage
 de l'onguent Basilicum, surtout si on le mêle
 avec égale partie de baume d'arcens, —
 parceque ce mélange d'onguents devient plus
 digestif, et par cela même fait que la chair
 morte se sépare, et que la plaie se mondifie
 plus promptement. si la chaleur de la saison,
 ou quelqu'autre cause fait que la plaie
 exhale une mauvaise odeur, ou si l'on
 craint que cette mauvaise odeur ne survienne
 il faut ajouter au digestif un tiers d'onguent
 œgyptiac. lorsqu'il se fait à la plaie une
 pourriture telle qu'un tiers d'onguent
 œgyptiac ne soit pas assez efficace, il faut
 ajouter une plus grande quantité de cet
 onguent, et même l'employer seul ou se

seroir de l'onguent de chélidoine, qu'on fait
avec une livre et demi de suc de Chélidoine,
trois livres de miel blanc, et des poudres d'aloes
et de mirrhe de chacune une once et
demi, se faut cuire le tout jusqu'à consistance
d'onguent. si l'habitude du corps est aride,
comme elle l'est presque toujours aux vieillards
et aux personnes maigres, on tire plus de
secours de l'onguent de miel qu'on fait avec
de jaunes d'œufs durcis et de miel blanc de
chaque quatre onces, qu'on unit exactement
au moien du pilon dans le mortier et aux
quels on ajoute une once et demi de Theriaca
fine commune; ce qui fait un onguent
plus relâchant que le premier. si le degré
de pourriture le demande, il convient encore
qu'avant de mettre dans la plaie quelqu'un
de ces onguents, on la lave avec l'onguent
egyptiac ou de Chélidoine délaïé dans une
suffisante quantité d'esprit de vin. la charpie
qu'on met soit en forme de plumaceaux, soit
en forme de tente selon l'espèce de la plaie,
doit être chargée de beaucoup d'onguent, et
on doit l'appliquer chaudement. la tente ne
doit pas être assez grosse pour empêcher
l'issue des matières, ni si dure qu'elle excite



de la douleur, mais a l'effel longue pour toucher
 presque au fond d'une plaie qui ne traverse pas
 entièrement un membre. que si la plaie
 pénètre si avant qu'on ne puisse porter une
 lente jusqu'au fond, on doit se contenter d'y
 serinquer une décoction d'orge chaude dans
 laquelle on aura fondre beaucoup de miel
 blanc, et même de l'onguent degyptiac si
 est nécessaire. ce médicament convient aussi
 a une plaie faite par une bale qui auroit
 traversé tout un membre, mais pour lors il
 faut infinner dans chaque trou un long
 bourdonnet chargé d'onguent. je préfère
 cette façon de panser a l'essai de petite
 corde qu'on fait passer d'un côté de la plaie
 a l'autre au moyen d'une longue aiguille
 mouffe; et qu'on tire ensuite deux fois par
 jour de haut en bas, de façon que la partie
 supérieure, qu'on a oingt d'onguent, devienne
 inférieure, et prenne la place de celle qu'on
 a tiré de l'intérieur de la plaie.

Il faut sçavoir de plus que la supuration
 commence ordinairement le second ou au
 plus tard le troisième jour. si elle vient avec
 abondance comme il arrive le plus souvent
 dans une plaie profonde, ou qui traverse

un membre considérable, il est nécessaire de
panser trois fois par jour; et j'ai remarqué que
s'il n'y a pas de forme en quelque endroit un sinus, il
faut, au moins que quelque chose ne s'y oppose, —
placer vers cet endroit une compresse ou une
espèce de petit coussin qui soit suffisamment
fermé au moyen du bandage, sans néanmoins —
que l'orifice de la plaie en soit comprimé. il
est même quelquefois nécessaire de se servir
de canule de plomb ou de canule d'argent
flexible. lorsqu'après la séparation des escarres,
il y a quelque tendon à nu, il faut mettre
dessus de la résine de thérébentine en poudre
très fine, jusqu'à ce qu'il soit recouvert de
chair. si un fil en crevant fait une plaie
avec contusion, il faut mettre dessus le cérat
de currim qui est composé d'emplâtre —
diapalme une livre, de cire jaune deux
onces, d'huile de Camomille et d'aneth de
chaque trois onces et demi, d'huile des
philosophes demi once, de Currim en poudre
six onces, des quels on ~~font~~ fait un cérat
selon l'art. lorsque les escarres se détachent
de la chair vive, s'il survient emorragie; —
on l'arrête comme on l'a dit cy dessus. —



Lorsque par le secours des remèdes dont on vient de parler, la plaie est modifiée sans être encore remplie de chair, il faut en exciter la génération; ce qu'on obtient au moyen du mélange d'onguent Basilicum, et de baume d'Arcus tel qu'on l'a ci dessus proposé. mais quand la plaie pénètre plus profondément, ou qu'elle traverse un membre, il faut y faire couler ou y seriquer un peu de baume de Copahu — chaud et au quel on ait ajouté égale partie de baume de soufre thérébentiné. Lorsque la plaie est une fois remplie de chair où la — conduit à cicatriser avec les emplâtres — diaphane, de minium et autres de ce genre.

pendant le temps de la cure qu'on vient de décrire, il faut avoir égard aux symptômes du nombre des quels la douleur est le premier qui attire, notre attention. elle survient ou parce qu'on se sert de médicaments aeres, ou parce que l'on met des tentes trop grosses ou trop dures, ou parce que le pus se trouve retenu, ou parce que la démangeaison excite à gratter les bords de la plaie, ou parce que la partie blessée est située trop bas, ou enfin

la douleur est excitée par l'aerimonie du sang ¹³ ou du pus, et alors les bords de la plaie sont rouges. on remédie aisément à tous ces cas en ôtant les causes. si c'est l'aerimonie qui produit la douleur, le médecin doit prescrire des remèdes adouçifans et capables d'évacuer les matières acres par les selles.

Le second symptôme est l'inflammation qui est ou produite par la douleur, ou attirée par l'application de médicaments gras sur la peau, ou excitée par de la soie de coton ou des linges sales de pus, ou enfin est causée par un vice du sang; mais je ne crois pas que l'inflammation vienne de ce que dans le cas où la plaie saigne, le sang en découle en petite quantité. ce symptôme se détruit en éloignant les différentes causes capables de le produire, mais si l'inflammation a pour cause le vice du sang, il en faut confier la cure au médecin, et d'urte appliquer sur le lieu enflammé, un emplâtre diaphane ou défensif. il convient aussi pour prévenir l'inflammation, de se servir de l'un de ces deux emplâtres.

Quant à la fièvre c'est au médecin à avoir soin de la prévenir ou de ~~se~~ remédier par

14 un bon régime de vivre, et par les remèdes —
convenables. le chirurgien fera le malade
le médecin le juge à propos.

à l'égard de l'Erysipèle, dont la cure
intérieure doit être confiée au médecin, on
remarque qu'il attaque presque toujours les
environs de la plaie, surtout si on n'a pas soin
de tenir la partie assez chaudement, et l'on
voit rarement qu'il se pette sur une partie
éloignée de la plaie. si l'Erysipèle est léger,
il faut appliquer dessus de la farine de froment,
si au contraire il est considérable, il est
nécessaire de se servir de cataplasmes faits avec
de la farine d'avoine. et il en faut continuer
l'usage, jusqu'à ce que toute l'enflure soit dissipée,
et que la partie paroisse avoir repris sa
couleur naturelle.

Un autre symptôme qui accompagne ces
plaies, est la distention des nerfs; et cet accident
arrive ou parce que quelque esquille d'os pique
un tendon ou ~~un~~ nerf. ou parce que le sang
et le sue nerveux sont mal conditionnés. le
premier cas demande qu'on ôte le fragment
d'os: le second cas exige le secours du
médecin.

Le dernier symptôme est le prurit. si est occasion-
né par l'application d'un emplâtre gras, il en faut
appliquer un plus sec. si provient de ce que le réta-
blissement de la santé s'approche, il s'en va quand
la convalescence est parfaite. si au contraire le
prurit est causé par de petites pustules, il faut les
joindre avec du saindoux au quel on aura ajouté
sur chaque once, deux dragmes de précipité blanc.

Sur cette il faut joindre atout ce qu'on a dit jusqu'à
quelques autres choses dont la connoissance est
nécessaire par rapport aux plaies d'armes à feu.
Lorsqu'un membre se soit saillié est déchiré et que
l'os est fracturé au point qu'on ne peut le rétablir,
le meilleur est d'en faire l'amputation. ou casoit
que quand un boulet de canon a emporté un
membre, il faut de même faire l'amputation;
quoique cependant si c'est le bras qui ait été em-
porté et que les symptômes ne soient pas pressants,
on puisse se contenter d'employer les remèdes
propres à séparer du vif tout ce qui est mort. si
un fusil chargé de poudre est tiré directement
au visage, il faut aussitôt donner de l'esprit
de vin au blessé, pour le faire revenir à lui.
L'Emorragie par les narines s'arrête presque
d'elle-même. on doit au surplus mettre sur le visage
un onguent composé de trois ou quatre parties
d'huile de raves et d'une partie de cire jaune.
on en garnit un petit linge qu'on applique
chaudement, ayant soin de ne point couvrir

16. les narines, ni la bouche, et le maintenant par des
bandelettes. La supuration étant établie par le moyen
de ce remède, la face qui est noircie par la poudre
devient de jour en jour à sa couleur naturelle. L'enflure
se dissipe, et les yeux commencent à se rouvrir. Le
sang caillé dans les narines bouchant l'ouverture par
laquelle l'air passe du nez dans la gorge, on doit le
dissoudre et le faire sortir en mettant dans les
narines de l'onguent qu'on vient de décrire. Le visage
étant guéri, il faut se servir pendant quelques jours
d'eau chaude dans laquelle on met un peu de
liqueur ou d'huile de tamarin par défilance, et avec
une éponge on humecte continuellement les grains
de poudre restés dans la peau, et on continue
jusqu'à ce qu'ils soient délaïés et emportés par ce
lavage. autrement on les tire avec une pointe de
lancette, qui pour cela est préférable à une
aiguille. mais il arrive souvent que les trous
profonds souffrent quelque noirceur qui se
dissipe et se guérit au moyen du mercure
précipité qu'on y tient appliqué pendant douze
heures, et au quel on ajoute l'onguent d'huile
de raves et de cire jaune. /.

Le 28 Janvier 1736

Traduit par

Le M^e

n^o 6. rejetté

L'achirurgie aime les
remèdes éprouvés.